



50 Buck Creek Rd #305 • (970) 393-5128 • info@youravodontist.com

Instrucciones Post Operatorias Para un Tratamiento de Conducto

Durante procedimiento de hoy, su diente se anestesió y se retiró el nervio dentro del diente. Esto se hace para minimizar la posibilidad de una futura infección o dolor en el diente. Sin embargo, usted debe entender que, al igual que todos los procedimientos dentales, este tratamiento se hace para aumentar las posibilidades de retener este diente de una manera sana, funcionamiento. El tratamiento de conducto no ofrece ninguna garantía. Un conducto radicular bien hecho puede permanecer sintomática para algún número de semanas después de la terapia. En última instancia, el tratamiento puede incluso fallar. Este no es nuestro expectativa, sin embargo. Su diente se evalúa cuidadosamente como un candidato para la terapia de conducto radicular, y que completan el tratamiento con la expectativa de que es una solución permanente para usted.

Su diente puede requerir una visita adicionales para la finalización del tratamiento. Si es así, entonces el diente tendrá un material de relleno temporal colocado. Dado que sólo es un relleno temporal, no debe morder o masticar manera agresiva. Usted debe tener especial cuidado para evitar los alimentos pegajosos hasta que su tratamiento se ha completado. En caso de que esta ruptura relleno temporal o salir, llame a nuestra oficina tan pronto como sea posible, para que podamos reemplazarlo.

Después de la terapia de conducto radicular, se requiere una corona cobertura total (PAC) para proteger el diente y asegurar su resistencia a la rotura. Fracturas completas de los dientes se ven con frecuencia en los rellenos se colocan en lugar de coronas siguientes del conducto radicular. Es su responsabilidad asegurarse de que su diente recibe una corona tan pronto como sea posible.

Hoy en día y esta noche, después de su tratamiento de conducto, se puede esperar que su diente de sentir dolor. El propio diente puede ser sensible a la presión y la zona que rodea el diente puede sentirse sensible también. Esta sensibilidad inicial es normal y esperado. Motrin normalmente funciona mejor como un calmante para el dolor después de la endodoncia. Sin embargo, si el diente ha tenido una historia de infección, trauma o dolor, entonces puede requerir un analgésico más fuerte. Si tiene alguna pregunta al respecto, no dude en llamar a la oficina. Infeciton puede o no puede estar presente en este momento. Si el médico le recetó un antibiótico para usted, entonces es importante que se tome todo el medicamento según las indicaciones. Se podría empeorar la condición tomando sólo algunos de los medicamentos, saltarse dosis, o no terminar la receta.

Si tiene alguna pregunta por favor llame a Brittany al (970) 393-5128

